

Sändes till Transfusionsmedicin

**Rapport vid Transfusionskomplikation***Blanketten används även när fel komponent/fel patient transfunderats*

Bedömning av reaktionens svårighetsgrad <input type="checkbox"/> Lätt <input type="checkbox"/> Måttlig <input type="checkbox"/> Svår  <b>Vid svår reaktion tag kontakt med transfusionsmedicin akutlab./jourhavande läkare.</b>	<b>Transfusion</b> <input type="checkbox"/> Erythrocyter <input type="checkbox"/> Plasma <input type="checkbox"/> Trombocyt koncentrat <input type="checkbox"/> Övrigt
<b>Aktuella symptom</b> <input type="checkbox"/> Blodtrycksfall <input type="checkbox"/> Enstaka utslag <input type="checkbox"/> Blodtrycksstegring <input type="checkbox"/> Generell rodnad <input type="checkbox"/> Pulsstegring <input type="checkbox"/> Urtikaria <input type="checkbox"/> Arytmi <input type="checkbox"/> Quincke ödem <input type="checkbox"/> Tryckkänsla över bröstet <input type="checkbox"/> Petechier <input type="checkbox"/> Illamående/kräkningar <input type="checkbox"/> Astma <input type="checkbox"/> Yrsel <input type="checkbox"/> Anafylaktisk chock <input type="checkbox"/> Kramper <input type="checkbox"/> TRALI <input type="checkbox"/> Diarré <input type="checkbox"/> Frysningar <input type="checkbox"/> Lumbal smärta <input type="checkbox"/> Feber (temp.....) <input type="checkbox"/> Hämoglobinuri <input type="checkbox"/> Dyspné <input type="checkbox"/> Ikterus <input type="checkbox"/> Cyanos <input type="checkbox"/> Inga symptom <input type="checkbox"/> Övrigt <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> <b>Fel komponent/fel patient transfunderad*</b>	<b>Enhetsnummer</b>
<b>Transfusionsmedicins anteckningar</b> Förprov: <input type="checkbox"/> finns <input type="checkbox"/> saknas      Anm:	<b>Förlopp</b> Transfusionen påbörjades den.....kl..... Och avbröts kl..... Då hela enheten/ cirka.....mL givits Transfusionskomplikationen observerades Den..... kl..... Blodprov för utredning tagna <sup>3</sup> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej Rapportör :
Efterprov: <input type="checkbox"/> erhållet <input type="checkbox"/> ej erhållet      Anm:	
Blodenhet/er sänd/a för blododling <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nej      Datum:	
Prov taget för IgA bristutredning <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nej      Datum:	



## Upplysningar

### 1.

Vid övrigt kan diagnos ifyllas om den kan tänkas påverka transfusionskomplikationen. Andra symtom som blödning, hetta, halssvullnad, domningar, stickningar samt slöhet/förvirring som kan tänkas förekomma, kan även anges vid "Övrigt". Feberreaktioner av varierande längd och intensitet är ett vanligt symptom. Ange tidigare temperaturstegringar, storlek och duration, samt vad som orsakat den. Medicinering som kunnat påverka förloppet, exempelvis betablockad m.m., bör anges, liksom tidigare misstänkta transfusionskomplikationer.

### 2.

Skriv av påsens/arnas nummer (om flera komponenter har givits samtidigt). Ange även andra pågående/nyligen avslutade infusioner.

### 3.

Vid **alla** reaktioner som rapporteras till Transfusionsmedicin skall ett 6 mL EDTA-rör tas. Vid lindriga reaktioner bedömer patientens ansvariga läkare om transfusionskomplikationen bör utredas eller inte. Med provet skall följa "Remiss Blodcentralen". Ange transfusionskomplikation på remissen.

Prov + remiss, samt väl försluten blodpåse i separat plastpåse, lämnas på Transfusionsmedicin. Med ledning av uppgifter om patientens symptom vid inträffad transfusionskomplikation avgör Transfusionsmedicin s läkare vilka åtgärder som skall vidtagas.

Vid misstanke om transfusionskomplikation till följd av **bakteriellt kontaminerad** komponent, måste blodpåsen snarast lämnas till Transfusionsmedicin. Odling på komponenten ombesörjes av Transfusionsmedicin. Odling på patientens blod (blododling) ombesörjes av vårdavdelningen / mottagningen.

**\*Fel komponent/fel patient transfunderad** (ex. transfusion till fel recipient).

Oavsett symptom måste detta rapporteras till Transfusionsmedicin.

Tag alltid kontakt med akutlab/jourhavande läkare Transfusionsmedicin.

OBS! I vissa fall kan symptomen vara fördröjda.

Eventuell provtagning sker i samråd med Transfusionsmedicin.

