

Cryptosporidium

Cryptosporidium förekommer globalt och kan orsaka övergående gastroenterit hos immunologiskt friska, speciellt individer med kreaturskontakt. Hos immundefekta patienter kan symptomen bli svåra och långdragna. *Cryptosporidium* har låg smittdos och kan orsaka utbrott av gastroenterit. Förekommer både som inhemsk smitta och utlandssmitta.

Provmaterial

Faecesburk med sked 15 ml med skruvlock. **Obs! Burk UTAN tillsats.**

För mer information, se [provtagningsanvisningar](#)

Analysmetod

Se [Faeces, parasit gastroenterit \(PCR\)](#)

Detektion i faeces-prov genom påvisning av nukleinsyra. Detekterar *Cryptosporidium parvum* och *Cryptosporidium hominis* som står för den absoluta majoriteten av kliniska fall hos människor. Vid hög misstanke om *Cryptosporidium*-infektion och negativ PCR, kan nytt prov skickas för mikroskopisk då PCR endast detekterar de två vanligaste *Cryptosporidium*-arterna. I analysen ingår även detektion av *Giardia* och *Entamoeba histolytica*.

Tänk på

Både remiss och prov måste märkas med rätt identitet, önskad analys och provtagningsdatum.

Proverna svaras ut elektroniskt inom 3 dygn från dess att provet ankommer till oss. För de kunder som inte är elektroniskt anslutna skickas provsvaren per fax eller brev.