

Pneumokockantigen i urin/likvor

Indikation

Misstanke om pneumokockinfektion.

Provmaterial

Urin/likvor minimum 1 ml.

Analysprincip

Kvalitativ snabbtest. Immunokromatisk membranmetod för påvisande av lösligt pneumokockantigen i urin hos patienter med pneumoni och i likvor hos patienter med meningit.

Provtagningsmaterial

6 eller 10 ml rör utan tillsats med skruvkork (gul eller vit). Se allmänna provtagningsanvisningar [KMIKAP0191](#).

Provtagning

Vanligt urinprov/lumbalprov.

Provtransport

Transport snarast möjligt till laboratoriet. Vid förvaring: Kylskåp.

Remiss

[Bakteriologiska laboratoriets remiss.](#)

Bedömning och svarsrutin

I svaret anges:

Positiv reaktion = förekomst av pneumokockantigen i urin/likvor.

Negativ reaktion = ingen förekomst av pneumokockantigen i urin/likvor.

Positiv reaktion talar starkt för aktuell pneumokockinfektion.

Svarsrutin: Analysen utförs dagligen och svarstiden beräknas vara 1-2 arbetsdagar. Svarstider avser tiden från att provet ankommit till laboratoriet till dess svar går ut. Svarstider kan avvika vid helger och helgdagar.