

# Parotitvirus

Annan benämning: påssjuka

<b>Metoder</b>	<b>PCR (viruspåvisning RNA)</b> Parotitvirus RNA (kvalitativ).  <b>Serologi (antikroppspåvisning)</b> Parotitvirusantikroppar IgG, IgM.  Referensgruppen i virologi rekommenderar att samtliga fall bör analyseras med PCR parallellt med IgM analys. Det är idag osäkert hur länge virus kan påvisas i saliv och urin varför båda för närvarande rekommenderas.
<b>Provmaterial</b>	<b>PCR (viruspåvisning RNA)</b> Sekret fr parotiskörtelns mynning, saliv, urin  <b>Serologi (antikroppspåvisning)</b> Serum
<b>Provtåg</b>	För PCR-analys krävs 0,5 ml prov. För serologisk analys krävs minst 0,5 ml serum.
<b>Svarsrutiner</b>	<b>PCR (viruspåvisning RNA)</b> Analys av Parotitvirus RNA (kvalitativ) utförs inom 2 dygn.  <b>Serologi (antikroppspåvisning)</b> Parotitvirusantikroppar IgG utförs en gång i veckan. Parotitvirusantikroppar IgM utförs 1-2 ggr/vecka.

## [Provtagningsanvisningar](#)

Läs mer om [parotitvirus](#).