

ESBL-bildande Enterobacterales och multiresistenta gramnegativa bakterier

Indikation

Misstanke om förekomst av ESBL-bildande *Enterobacterales* (inklusive ESBL-CARBA) eller multiresistenta gramnegativa tarmbakterier, t ex multiresistent *Pseudomonas*, karbapenemresistent *Acinetobacter*.

Provmaterial

Faeces, rektum med synlig förekomst av avföring, samt i förekommande fall sår, hudlesioner, drän, urin* mm. *Om patienten har/haft KAD eller kateteriseras intermittent eller har UVI-symtom.

OBS! Analysen utförs normalt inte på prover från näsa, svalg eller perineum. Vid frågeställning om karbapenemresistent *Acinetobacter* kan prover tas från svalg och perineum.

Provtagning

Prover tas med provtagningspinnar ex Eswab. Använd sterilt rör utan tillsats för urinprover.

Provtransport

Omgående transport till laboratoriet. Vid förvaring: kylskåp.

Remiss

[Bakteriologiska laboratoriets remiss](#) eller elektronisk beställning. Frågeställning "ESBL" måste alltid anges.

Bedömning och svarsrutiner

- Ingen växt av ESBL-bildande bakterier inklusive ESBL-CARBA.
- Vid växt av ESBL-bildande bakterier anges art och resistensmönster samt aktuell resistensmekanism (ESBL, AmpC, ESBL-CARBA).
- Vid växt av multiresistenta gramnegativa tarmbakterier anges art och resistensmönster

Proverna svaras ut elektroniskt, och för de kunder som inte är elektroniskt anslutna skickas provsvaren per fax eller brev. Svar lämnas vanligen inom 2-3 dagar från provets ankomst till laboratoriet.

Läs mer

[Provtagningsmateriel mikrobiologi](#)

[Remiss](#)