

# Toxoplasma gondii

<b>Metoder</b>	<b>PCR (påvisning DNA)</b> Toxoplasma gondii-DNA (kvalitativ).  <b>OBS! PCR utförs ej på serum.</b>  <b>Serologi (antikroppspåvisning)</b> Toxoplasma gondii-antikroppar IgG, IgM. Ingår även i analysblocken Neurotrofa virus och TORCH.
<b>Provmaterial</b>	<b>PCR (påvisning DNA)</b> EDTA-blod, glaskropp, cerebrospinalvätska ("likvor"), vävnadsmaterial  <b>Serologi (antikroppspåvisning)</b> Serum
<b>Provåtgång</b>	För PCR-analys krävs 0,5 ml prov. För serologisk analys krävs minst 0,5 ml serum.
<b>Svarsrutiner</b>	<b>PCR (viruspåvisning DNA)</b> Toxoplasma gondii-DNA (kvalitativ) utförs 2 ggr/vecka. Svarstiden är 1-7 dagar.  <b>Serologi (antikroppspåvisning)</b> Toxoplasma gondii-antikroppar IgG utförs varje vardag. Toxoplasma gondii-antikroppar IgM utförs varje vardag. Svarstid 1-3 dagar.  Svarstider avser tiden från provet ankommit till laboratoriet till dess svar går ut. Svarstider kan avvika vid helger och helgdagar.

## [Provtagningsanvisningar](#)