

Prostatasekret

Indikation

Misstanke om bakteriell infektion i prostata.

Provmaterial

Sekret från prostata.

Analysprincip

Aerob odling på selektiva och icke selektiva medier med avseende på bakterier.

Provtagningsmaterial

ESwab eller sterilt provtagningsrör.

Provtagning

Omedelbart före provtagningen bör patienten ha kastat vatten varefter urethramynningen torkas torr. Prostatasekret taget via urethra är alltid tillblandat med den normala urethrafloran. Genom att först ta ett prov från främre urethra och därefter göra prostatamassage och samla upp sekretet kan man få en bättre uppfattning om bakteriefloran i prostata.

Transport

Sänd provet omgående. Om detta ej är möjligt förvaras provet i kyl, t ex över natt, i avvaktan på transport.

Remiss

[Bakteriologiska laboratoriets remiss](#). Ange eventuell antibiotikaterapi på remissen.

Bedömning och svarsrutiner

Mindre mängder bakterier tillhörande den normala urethrafloran resistensbestäms ej. Dominans av ett visst bakterieslag, liksom även fynd av bakterier som normalt ej ska finnas i urethra, anges och resistensbestäms. Vid fynd av potentiella patogener lämnas svar vanligen inom 1-3 vardagar från provets ankomst till laboratoriet. Vid avsaknad av potentiella patogener besvaras provet efter 2 vardagar.

Proverna svaras ut elektroniskt och för de kunder som inte är elektroniskt anslutna skickas provsvaren per fax eller brev.

Speciella frågeställningar

Chlamydia kräver särskilt provtagningsmaterial och metodik. Se [Chlamydia trachomatis](#).

Läs mer

- [Provtagningsmaterial mikrobiologi](#)
- [Remiss](#)