

Trypanosomiasis

- **Afrikansk trypanosomiasis (afrikansk sömnsjuka)**

Finns endast i tropiska Afrika och orsakas av *Trypanosoma brucei gambiense* och *T. brucei rhodesiense*. Parasiten överförs till människa med tse-tse flugor. Ger förutom allmänsymtom även symtom från centrala nervsystemet.

- **Amerikansk trypanosomiasis (Chagas sjukdom)**

Finns i Syd- och Mellanamerika. Parasiten överförs med skinnbaggar (Triatoma). Vid akut sjukdom kan parasiter påvisas i blod, men vid den kroniska formen kan parasiter inte påvisas.

Analysmetoder

1. Parasitologi, Trypanosomiasis (mikroskopi)

- **Kontakta alltid Parasitlab före provtagning! Tel 031-342 46 45.**

Provtagning

- Blod i EDTA-rör och/eller likvor i sterilt rör utan tillsats. Lämnas till laboratoriet snarast.

Analysprincip

- Utstryk av blod eller likvor på objektglas, färgas med Giemsa. Därefter utföres mikroskopi.

Remiss

- På [Bakteriologiska laboratoriets remiss](#) anges kliniska och epidemiologiska data.

Svar

- Förekomst av trypomastigoter. Telefonsvar vid positivt fynd.

2. Serologi

Utförs på Folkhälsomyndigheten, www.folkhalsomyndigheten.se

För utförlig information om utredning och provtagning, se www.parasitologi.se

Tänk på:

- Kontakta alltid Parasitlab. före provtagning! Tel 031-342 46 45.
- Både remiss och prov måste märkas med rätt identitet, önskad analys och provtagningsdatum.
- Proverna svaras ut elektroniskt och för de kunder som inte är elektroniskt anslutna skickas provsvaren per fax eller brev.

Läs mer

- [Provtagningsmateriel mikrobiologi](#)
- [Remiss](#)
- [Folkhälsomyndigheten](#)
- [Parasitologi](#)