

Varicella zoster (VZV)

Annan benämning: bältros, herpes zoster, vattkoppor

Metoder	PCR (viruspåvisning DNA) Varicella zoster DNA (kvantitativ & kvalitativ) Ingår även i likvoranalysen " CNS-infektioner, snabb-PCR " Serologi (antikroppspåvisning) Varicella zoster virusantikroppar IgG, IgM Ingår även i analysblocket Neurotrofa virus
Provmaterial	PCR (viruspåvisning DNA) Blåssekret, sårsekret, likvor*, serum*, ögonsekret, glaskropp, EDTA-blod* * = <i>Kvantifiering utförs</i> Serologi (antikroppspåvisning) Serum, likvor OBS! Likvor ska alltid åtföljas av serum. Likvor är bara nödvändigt vid frågeställningen Neurotrofa virus.
Provåtgång	För PCR-analys krävs 0,5 ml prov. För analysen "CNS-infektion, snabb-PCR" krävs 0,8 ml likvor. För serologisk analys krävs minst 0,5 ml serum och 0,5 ml likvor.
Svarsrutiner	PCR (viruspåvisning DNA) Snabb- PCR besvaras samma dag om provet ankommer till laboratoriet senast kl 16 på vardagar eller kl 13 på helger. Kvantitativ analys av Varicella zoster (DNA) besvaras inom 1-2 dygn beroende på ankomsttid till laboratoriet. Svar ges i genomekvivalenter per milliliter provmaterial(Geq/ml). Kvalitativ analys av Varicella zoster (DNA) utförs 2-3 ggr/vecka. Serologi (antikroppspåvisning) Varicella zoster virusantikroppar IgG utförs varje vardag. Varicella zoster virusantikroppar IgM utförs 2 ggr/vecka.

[Provtagningsanvisningar](#)

Läs mer om [varicella zoster](#).