

# Varicella zoster (VZV)

Annan benämning: bältros, herpes zoster, vattkoppor

<b>Metoder</b>	<b>PCR (viruspåvisning DNA)</b> Varicella zoster DNA (kvantitativ & kvalitativ) Ingår även i likvoranalysen " <a href="#">CNS-infektioner, snabb-PCR</a> "  <b>Serologi (antikroppspåvisning)</b> Varicella zoster virusantikroppar IgG, IgM Ingår även i analysblocket <a href="#">Neurotrota virus</a>
<b>Provmaterial</b>	<b>PCR (viruspåvisning DNA)</b> Blåssekret, sårsekret, likvor*, serum*, ögonsekret, glaskropp, EDTA-blod*  * = <i>Kvantifiering utförs</i>  <b>Serologi (antikroppspåvisning)</b> Serum, likvor  <b>OBS!</b> Likvor ska alltid åtföljas av serum. Likvor är bara nödvändigt vid frågeställningen Neurotrota virus.
<b>Provtåg</b>	För PCR-analys krävs 0,5 ml prov. För analysen "CNS-infektion, snabb-PCR" krävs 0,8 ml likvor. För serologisk analys krävs minst 0,5 ml serum och 0,5 ml likvor.
<b>Svarsrutiner</b>	<b>PCR (viruspåvisning DNA)</b> Snabb- PCR besvaras samma dag om provet ankommer till laboratoriet senast kl 16 på vardagar eller kl 13 på lördagar. Kvantitativ analys av Varicella zoster (DNA) utförs 2 ggr/vecka. Svar ges i genomekvivalenter per milliliter provmaterial (Geq/ml). Kvalitativ analys av Varicella zoster (DNA) utförs 2-3 ggr/vecka.  <b>Serologi (antikroppspåvisning)</b> Varicella zoster virusantikroppar IgG utförs varje vardag. Varicella zoster virusantikroppar IgM utförs 2 ggr/vecka.

## [Provtagningsanvisningar](#)

Läs mer om [varicella zoster](#).