

# Enterovirus

Annan benämning: coxsackievirus, echovirus, poliovirus

<b>Metoder</b>	<b>PCR (viruspåvisning RNA)</b> Enterovirus-RNA (kvantitativ & kvalitativ). Analys av enterovirus ingår även i analysen "CNS- infektioner, snabb- PCR" (erebrospinalvätska) och i analysen Luftvägsblock. Se även analysen <a href="#">Luftvägsblock</a>
<b>Provmaterial</b>	<b>PCR (viruspåvisning RNA)</b> Cerebrospinalvätska ("likvor")*, serum*, bläsekret, faeces, vävnadsmaterial och EDTA-blod*  * = <i>Kvantifiering utförs</i>
<b>Provåtgång</b>	För PCR-analys minst 0,5 ml prov. HSV1, HSV2, VZV, HHV6, HHV7, HHV8, Parvovirus, adenovirus, JC-virus och Enterovirus kan beställas tillsammans med maximalt 8 analyser per prov med minst 0,5 mL provmaterial för kvantifiering (PCR). För analysen "CNS- infektion, snabb- PCR" krävs 0,8 mL cerebrospinalvätska.
<b>Svarsrutiner</b>	<b>PCR (viruspåvisning RNA)</b> Analysen "CNS-infektion, snabb-PCR" besvaras samma dag om provet ankommer till laboratoriet senast kl 16 på vardagar eller kl 13 på helger.  Kvantitativ analys av enterovirus (RNA) utförs 1 ggr/vecka. Svar ges i 10-log av antal genomekvivalenter (Geq)/ml provmaterial.  Svarstid kvantitativ analys: 1-7 dagar  Kvalitativ analys av enterovirus (RNA) utförs 4-5 ggr/vecka.  Svarstid kvalitativ analys: 1-3 dagar  Svarstider avser tiden från provet ankommit till laboratoriet till dess svar går ut. Svarstider kan avvika vid helger och helgdagar

## [Provtagningsanvisningar](#)