

Enterovirus

Annan benämning: coxsackievirus, echovirus, poliovirus

Metoder	PCR (viruspåvisning RNA) Enterovirus-RNA (kvantitativ & kvalitativ). Analys av enterovirus ingår även i analysen "CNS- infektioner, snabb- PCR" (erebrospinalvätska) och i analysen Luftvägsblock. Se även analysen Luftvägsblock
Provmaterial	PCR (viruspåvisning RNA) Cerebrospinalvätska ("likvor")*, serum*, bläsekret, faeces, vävnadsmaterial och EDTA-blod* * = <i>Kvantifiering utförs</i>
Provåtgång	För PCR-analys minst 0,5 ml prov. HSV1, HSV2, VZV, HHV6, HHV7, HHV8, Parvovirus, Adenovirus, JC-virus och Enterovirus kan beställas tillsammans med maximalt 8 analyser per prov med minst 0,5 mL provmaterial för kvantifiering (PCR). För analysen "CNS- infektion, snabb- PCR" krävs 0,8 mL cerebrospinalvätska.
Svarsrutiner	PCR (viruspåvisning RNA) Analysen "CNS-infektion, snabb-PCR" besvaras samma dag om provet ankommer till laboratoriet senast kl 16 på vardagar eller kl 13 på helger. Kvantitativ analys av Enterovirus (RNA) utförs 1 ggr/vecka. Svar ges i genomekvivalenter per milliliter provmaterial (Geq/mL). Svarstid kvantitativ analys: 1-7 dagar Kvalitativ analys av Enterovirus (RNA) utförs 4-5 ggr/vecka. Svarstid kvalitativ analys: 1-3 dagar Svarstider avser tiden från provet ankommit till laboratoriet till dess svar går ut. Svarstider kan avvika vid helger och helgdagar

[Provtagningsanvisningar](#)