

# Luftvägsblock

<b>Metoder</b>	<b>PCR (påvisning DNA/RNA)</b> Luftvägsblock (kvalitativ) innefattar analys av följande 18 agens:  Adenovirus DNA Bocavirus DNA Bordetella pertussis DNA Influensavirus A och B RNA Metapneumovirus RNA Parainfluensa (1, 2 och 3) RNA Respiratory syncytial virus (RSV) RNA Rhinovirus RNA Enterovirus RNA Coronavirus (NL 63, OC 43, 229E och HKU1) RNA Mykoplasma pneumoniae DNA Chlamydia pneumoniae/TWAR DNA  <b>Filmarray</b>  I särskilt akuta fall – efter telefonkontakt med virusdetektion (tel 031-342 47 48) eller jourhavande virolog – kan en alternativ snabb-PCR användas.
<b>Provmaterial</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nasofarynx- och svalgprov i samma ESwab-rör (alternativt i rör med 1-2 ml koksalt)</li><li>Bronchialskölvätska (BAL)</li><li>Nasopharynxaspirat.</li></ul> OBS! Luftvägsblocket utförs inte på serum!
<b>Provåtgång</b>	För PCR-analys krävs 0,5 ml prov.
<b>Svarsrutiner</b>	Luftvägsblocket analyseras måndag-lördag. Prov för luftvägsblock analyseras och besvaras samma dag, såvida provet kommer till laboratoriet före klockan 08:30 och är akutmärkt.

## [Provtagningsanvisningar](#)

Läs mer om [adenovirus](#), [bocavirus](#), [influensavirus](#), [metapneumovirus](#), [parainfluensavirus](#), [RSV](#), [rhinovirus](#), [enterovirus](#), [coronavirus](#), [mykoplasma pneumoniae](#), [chlamydia pneumoniae \(TWAR\)](#).