

Anaplasma phagocytophilum

Allmänt

Intracellulär, icke-odlingsbar bakterie. Fästingburen.

Indikation

Patient med följande klinisk bild:

- Influensaliknande sjukdom med feber, huvudvärk, muskelvärk
- Leverpåverkan

Provmaterial

Blod.

Analysprincip

PCR (polymerase chain reaction).

Provtagningsmaterial

EDTA-rör med lila kork, ca 0,5-2 ml. Använd gärna "EDTA-rör", art.nr 102770195

Provtransport

Prov transporteras i rumstemperatur.

Remiss

[Bakteriologiska laboratoriets remiss](#). Ange att PCR avseende ”*Anaplasma phagocytophilum*” önskas. Ange också symtombild enligt ovan (indikation) samt i förekommande fall antibiotikabehandling.

Bedömning och svarsrutiner

Förekomst eller inte av *Anaplasma phagocytophilum*. Svarstiden är 1–7 dygn och proverna svaras ut via Central Registret (CR). För de kunder som inte är anslutna till CR skickas provsvaren per fax eller brev.

Svarstider avser tiden från att provet ankommit till laboratoriet till dess svar går ut. Svarstider kan avvika vid helger och helgdagar.

Speciella frågeställningar

Provtagning och analys rekommenderas inte på patienter utan aktuell infektion.

Vid frågor tag kontakt med DNA-lab, tel 031-342 46 98.