



## Upplysningar

### 1.

Vid övrigt kan diagnos ifyllas om den kan tänkas påverka transfusionskomplikationen. Andra symtom som blödning, hetta, halssvullnad, domningar, stickningar samt slöhet/förvirring som kan tänkas förekomma, kan även anges vid "Övrigt". Feberreaktioner av varierande längd och intensitet är ett vanligt symptom. Ange tidigare temperaturstegringar, storlek och duration, samt vad som orsakat den. Medicinering som kunnat påverka förloppet, exempelvis betablockad m.m., bör anges, liksom tidigare misstänkta transfusionskomplikationer.

### 2.

Skriv av påsens/arnas nummer (om flera komponenter har givits samtidigt). Ange även andra pågående/nyligen avslutade infusioner.

### 3.

Vid **alla** reaktioner som rapporteras till Transfusionsmedicin skall ett 6 mL EDTA-rör tas. Vid lindriga reaktioner bedömer patientens ansvariga läkare om transfusionskomplikationen bör utredas eller inte. Med provet skall följa "Remiss Blodcentralen". Ange transfusionskomplikation på remissen.

Prov + remiss, samt väl försluten blodpåse i separat plastpåse, lämnas på Transfusionsmedicin. Med ledning av uppgifter om patientens symptom vid inträffad transfusionskomplikation avgör Transfusionsmedicin s läkare vilka åtgärder som skall vidtagas.

Vid misstanke om transfusionskomplikation till följd av **bakteriellt kontaminerad** komponent, måste blodpåsen snarast lämnas till Transfusionsmedicin. Odling på komponenten ombesörjes av Transfusionsmedicin. Odling på patientens blod (blododling) ombesörjes av vårdavdelningen / mottagningen.

